

Entscheidungsbaum Fliegenbekämpfung

0816

Fliegen im Stall?

Sofortmaßnahmen:

d.h. im Stall sind Tiere und diese werden in nächster Zeit nicht ausgestallt

1. Desintec AnoEx ausbringen zur Abtötung der Fliege, Wiederholung nach x Tagen
2. Desintec CyroEx ausbringen zur Abtötung der Larven, Wiederholung nach 14-21 Tagen



BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

Routine- Maßnahmen:

d.h. der Stall wird in Kürze geleert oder steht bereits leer

1. Stall mit chemischen Reinigungsmittel (Desintec StallClean gründlich reinigen)
2. Alzogur ausbringen*, einwirken lassen und mit Wasser abspülen, Flächen abtrocknen lassen
* beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zur korrekten Ausbringung von Alzogur um die Fliegenbekämpfung zu optimieren
3. Desinfektion der Flächen, Flächen abtrocknen lassen
4. Tiere einstellen

Wenn Fliegen, deren Eier oder deren Larven durch einen externe Eintrag (z.B. durch Einstreu, Güllelagerung stallweise und Leerung der Ställe abteilweise, unvollständige Güllebehandlung mit Alzogur etc.) erneut im belegten Stall zu finden sind, dann muss umgehend im belegten Stall ein Fliegen- und Larvenprodukt angewendet werden. (siehe Sofortmaßnahmen)